

STRAWBAG®

Marque déposée par l'Association ARGILE

Kit à usage unique, destiné aux usagers de drogues par inhalation (sniff), pour la participation à la réduction des risques de contamination, notamment par le virus de l'hépatite C.

2 coton-tiges imprégnés
d'un mélange d'huiles végétales
naturelles adoucissants

Préservatif masculin NF

Dosette de
lubrifiant intime

2 dosettes
d'eau
stérile

Mini-pilon pour
écraser finement
les cristaux de poudre

2 pailles de 8cm de long.
Matière transparente
de qualité médicale,
semi-souples et non
électrostatiques

Coupelle miroir
Format 50 x 90mm
Parois lisses et réfléchissantes

Cartonnette proligne

2 mouchoirs
en papier



TOUT PRODUIT INJECTABLE PEUT SE SNIFFER

1. Préparez les narines, c'est à dire débouchez-les avec un mouchoir.
2. Préparez les lignes : écrasez la came (produit) sur la surface miroir et pulvérisez-la avec le fond du tube utilisé comme mini-pilon, jusqu'à obtenir une poudre très fine. Plus la poudre est fine, moins il y aura de risque que des «grains de dope» restent bloqués dans les poils du nez et abîment les muqueuses. Pour faire vos lignes, utilisez la cartonnnette proligne.
3. A chaque sniff, il faut enfoncer la «paille», haut dans la cavité nasale.
4. Rincez le nez avec de l'eau une dizaine de minutes après inhalation (sniff). En effet, l'intérieur du nez est constitué d'un tissu très sensible agrémenté de poils. Au moment de l'inhalation, une partie de la poudre reste prisonnière des poils provoquant ainsi des irritations qui peuvent entraîner des saignements du nez, des nécroses, voire une perforation de la cloison nasale.
Il faut boire de l'eau par le nez et la recracher par la bouche afin d'irriguer les muqueuses déshydratées et la gorge qui a également subi l'action corrosive de la poudre.
5. Entretenez les narines et les muqueuses avec le mélange d'huiles végétales naturelles adoucissantes qui imprègne l'extrémité jaune des coton-tiges contenus dans le Kit STRAWBAG®. Si les brûlures au niveau des sinus persistent, c'est un signe d'abus et il faut arrêter les inhalation de poudre. De même s'il y a saignement et apparition de croûte dans le nez, il faut consulter un médecin.

Trop sniffer risque d'endommager l'odorat

Sniffer ne met pas à l'abri des overdoses

Ne prêter jamais votre matériel

Ne partagez jamais la paille, l'inhalateur, le mouchoir, la surface...

Évitez de gober (trip ou Ecstasy) après des sniffs à répétition car vous risquez de faire un malaise ou un «bad trip»

N'oubliez pas de vous protéger en cas de relation sexuelle.

